



Courgette

Carbassó

La courgette est une plante annuelle de la famille des Cucurbitacées, originaire d'Amérique centrale. La courgette est une plante monoïque c'est à dire que la même plante porte aussi bien les fleurs femelles que les fleurs mâles.

BIENFAIT : Elle est très riche en vitamines et pauvre en calories.

Période Semis & Plantation

| | |
|---------------------|--|
| Semis direct | Avril-juin. |
| Plantation | Plants en mottes : de fin avril à mi-juillet. |
| Récolte | La période de récolte a lieu environ 1 à 2 mois après les semis, en été jusqu'au début de l'automne. |



Ravageurs

| | |
|--|--|
| La courgette ne connaît pas vraiment de ravageurs. | |
| Les aleurodes | Plutôt sous tunnel. |
| Les pucerons | |
| Les acariens | On observe l'apparition de minuscules tâches chlorotiques plus ou moins dispersées sur le limbe. |

Maladies

Oïdium :
Champignon responsable de l'apparition de tâches blanches sur les feuilles.

Botrytis :
Champignon à l'origine de l'apparition d'un feutrage gris sur les feuilles et les tiges. Les fleurs et les fruits prennent une couleur brune et se nécrosent.



Oïdium



Per l'Assumpció,
es planta la grana
del Senyor :
el carbassó.

Traitements Bio préventifs / curatifs

- **Contre l'oïdium** : poudrage à la fleur de soufre ou pulvérisation au soufre mouillable en préventif ; couper les feuilles atteintes.
- **Décoction de racines d'orties ou d'oseilles** : (100 g de racines à faire tremper dans 1 l d'eau pendant 24h puis chauffer 30 min), ou traitement à base de lait (0,5 l de lait écrémé pour 4,5 l d'eau) à pulvériser hebdomadairement pour faire disparaître l'oïdium.
- **Décoction de prêle ou d'ail** contre le botrytis, ou pulvérisation de talc qui dessèche le mycelium.

Auxiliaires

| | |
|----------------------|---|
| CONTRE LES ACARIENS | <i>Feltiella acarisuga</i> et <i>Macrolophus caliginosus</i> . |
| CONTRE LES ALEURODES | <i>Eretmocerus eremicus</i> . |
| CONTRE LES PUCERONS | Les hyménoptères <i>Aphelinus abdominalis</i> , <i>Aphidius colemani</i> , <i>Aphidius ervi</i> , <i>Aphidoletes aphidimyza</i> . |

Plantes associées



► **Association** : bourrache, capucine, œillet d'inde, attireront les pollinisateurs.

► **Associer la plante avec** ciboulette, céleri, échalote, haricot, fève, petit pois, maïs, basilic, marjolaine.

Paillage/arrosage

La fréquence des arrosages doit être élevée, particulièrement en sols filtrants. L'irrigation au goutte à goutte est conseillée.

Un paillage composé des débris de végétaux de jardin (tonte de pelouse, feuilles) apportera tout au long de l'été fraîcheur et nourriture.