



Fève

Fava

Vicia Faba

La fève appartient à la famille des Fabacées, plantes qui ont la formidable particularité de fixer l'azote atmosphérique dans leurs nodules racinaires et de le restituer, elles servent donc d'engrais vert !

Les fèves sont des légumineuses annuelles, cultivées séculairement au proche et moyen-orient. La plante aime les terrains riches, argileux et frais.

BIENFAIT : Les fabacées peuvent avoir quelques effets sur des maladies liées aux reins. La fève a des propriétés diurétiques, les fleurs en infusion calmeraient les douleurs rénales, les décoctions des gousses soigneraient les cystites et les calculs. Ce sont aussi d'excellentes sources de protéines.

Période Semis & Plantation

Semis	Semer directement en place du mois de février à avril (d'octobre à novembre si l'on profite d'un climat doux comme le notre).
Exposition	Préfèrent un endroit protégé.
Sol	Terre riche, mais poussent dans tout sol bien travaillé et drainé.
Récolte	La période de récolte a lieu environ trois à quatre mois après les semis soit à partir de mai-juin. Les semis d'automne donneront des fèves plus précoces, susceptibles d'être moins envahies par les pucerons.

Ravageurs



Les acariens	Ils peuvent apparaître plus tardivement provoquant un dessèchement des feuilles sans réellement mettre en péril la culture.
Les pucerons noirs de la fève (<i>Aphis fabae</i>)	Ces insectes favorisent l'apparition de fumagine, le miellat qu'ils excrètent favorise le développement du champignon.

Maladies

La rouille :

Champignon responsable de l'apparition d'auréoles rougeâtres sur la face supérieure des feuilles ; sur la face inférieure on trouve des petites pustules poudreuses de couleur beige à brun.

L'antracnose (plus rarement) :

Champignon responsable de l'apparition de tâches rondes et brunes bien délimitées.



Pucerons sur fève

Traitements Bio préventifs / curatifs

- **Pulvérisation** de purin d'ortie sur le sol pour prévenir la rouille.
- **Pulvérisation** du purin d'ortie, **décoction** de prêle, décoctions d'ail, purin de consoude pour lutter contre l'antracnose.
- **Rotation des cultures** : attendre trois ou quatre ans avant de semer des fèves au même emplacement.

*Les faves d'abril,
les vull per a mi;
les faves de maig,
per al meu cavall.*



Auxiliaires

CONTRE LES PUCERONS

Les coccinelles, syrphes, chrysopes, l'hyménoptère *Aphidius colemani*.



Plantes associées



- **Association avec** aubergine, carotte, céleri, chou, épinard, fraisier, laitue, maïs, navet, pomme de terre, radis, soucis.
- Basilic, phacélie, aneth entre chaque ligne pour prévenir l'invasion des pucerons.

Paillage/arrosage

Il faut arroser pendant les phases correspondant au début de la ramification, la floraison, et le remplissage des gousses.

Il est déconseillé d'irriguer la culture pendant les deux premières semaines qui suivent le semis, vu qu'un excès d'eau à ce stade réduit la croissance de la plante et augmente les risques de pourriture des racines.