



Pomme de Terre

Trufa, trumfa, patana

Solanum tuberosum L.

La pomme de terre appartient à la famille des Solanacées. C'est un des tubercules les plus nutritifs donc un des plus cultivés (elle pousse quasiment sous tous les climats).

Dans le département, on connaît bien la Pomme de Terre Béa, une variété primeur spécifique du Roussillon. Sa chair est jaune pâle, sa peau très lisse. En bouche sa saveur est légèrement sucrée et sa texture fondante. Elle a reçue le label AOC pomme de terre primeur du Roussillon.

Période Semis & Plantation

Plantation	Planter les tubercules germés en mars.
Récolte	La récolte se fait de mai à juillet.
Exposition	Soleil, mi-ombre.
Sol	Fertile, travaillé, drainé.

Ravageurs



Les doryphores	Les larves comme les adultes se nourrissent des feuilles des solanacées (tomates, aubergines...).
-----------------------	---

Maladies

Le Mildiou :
Ce champignon provoque à l'intérieur des tubercules l'apparition de taches brunes. Sur la face inférieure des feuilles on note l'apparition d'un duvet blanc et de taches brunes sur la face supérieure.

L'alternariose (plus rarement) :
Cette maladie fongique entraîne l'apparition de taches brunes bien délimitées sur les feuilles, et sur les tubercules des taches brunes déprimées.



Doryphore

Traitements Bio préventifs / curatifs

• **En curatif contre les larves de doryphores** : lutte mécanique par ramassage dès les premières apparitions de larves, pulvérisation d'une macération huileuse aux épices (curry fort, massalé fort, ras el Hanout...), huile essentielle de lavande ou *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis*.

En cas de forte attaque, pulvérisation au pyrèthre (extrait de fleurs séchées, à ne pas confondre avec les pyrèthroïdes qui sont des produits de synthèse) à renouveler à 2 jours d'intervalle.

• **Contre le mildiou** (en préventif ou en début d'attaque) et comme alternative à la bouillie bordelaise : le bicarbonate de soude (1 c.à.c de bicarbonate de soude + 1 c.à.c de savon de Marseille pour 1l d'eau).

• **Décoction d'ail ou de prêle** en préventif contre l'alternariose.


• **Rotation des cultures.**

• **A l'arrosage** éviter les éclaboussures qui favorisent le développement des maladies cryptogamiques.

Auxiliaires

CONTRE LES LARVES DES
DORYPHORES

Les carabes.



Plantes associées



► **Association avec** : l'ail, le céleri, les asperges, le chou, les fèves, les haricots, les pois ou autres fabacées.

► Planter du lin, de la coriandre, des œillets d'Inde, des pétunias, des capucines qui éloignent les doryphores.

Paillage/arrosage

► Les pommes de terre ne sont pas exigeantes en eau. Ne les arroser que si le printemps est sec.

► Paillage recommandé.